

ANIMALES DE COMPAÑÍA



Nicilan® 40 mg / 10 mg Comprimidos para perros y gatos



COMPOSICIÓN:

Amoxicilina
(como trihidrato)
40 mg
Ácido clavulánico
(como clavulanato
de potasio)

INDICACIONES: Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por cepas productoras de β -lactamasas resistentes a la amoxicilina. Infecciones de las vías respiratorias, genitourinarias y digestivas. Infecciones de la piel y tejidos blandos.

POSOLOGÍA: Vía oral. 10 mg de amoxicilina + 2,5 mg de ácido clavulánico / kg de p.v. dos veces al día.

PRESENTACIÓN: 10 x 6 comprimidos 40 mg / 10 mg.

Prescripción
veterinaria

Reg:
ICA 9599 MV

Nicilan® 200 mg / 50 mg Comprimidos para perros



COMPOSICIÓN:

Amoxicilina
(como trihidrato)
200 mg
Ácido clavulánico
(como clavulanato
de potasio)
50 mg

INDICACIONES: Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por cepas productoras de β -lactamasas resistentes a la amoxicilina. Infecciones de las vías respiratorias, genitourinarias y digestivas. Infecciones de la piel y tejidos blandos.

POSOLOGÍA: Vía oral. 10 mg de amoxicilina + 2,5 mg de ácido clavulánico / kg de p.v. dos veces al día.

PRESENTACIÓN: 10 x 6 comprimidos 200 mg / 50 mg.

Prescripción
veterinaria

Reg:
ICA 9600 MV

Nicilan® 400 mg / 100 mg Comprimidos para perros



COMPOSICIÓN:

Amoxicilina
(como trihidrato)
400 mg
Ácido clavulánico
(como clavulanato
de potasio)
100 mg

INDICACIONES: Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por cepas productoras de β -lactamasas resistentes a la amoxicilina. Infecciones de las vías respiratorias, genitourinarias y digestivas. Infecciones de la piel y tejidos blandos.

POSOLOGÍA: Vía oral. 10 mg de amoxicilina + 2,5 mg de ácido clavulánico / kg de p.v. dos veces al día.

PRESENTACIÓN: 10 x 6 comprimidos 400 mg / 100 mg.

Prescripción
veterinaria

Reg:
ICA 9601 MV

NICILAN®

Tratamiento de **amplia gama**
infecciones bacterianas en perros y gatos.

NICILAN® 40 mg / 10 mg

PESO (kg)	NÚMERO DE COMPRIMIDOS
1-2 kg	1/2
3-5 kg	1
6-9 kg	2
10-13 kg	3
14-18 kg	4

NICILAN® 200 mg / 50 mg

PESO (kg)	NÚMERO DE COMPRIMIDOS
20 kg	1
30 kg	1+1/2
40 kg	2

NICILAN® 400 mg / 100 mg

PESO (kg)	NÚMERO DE COMPRIMIDOS
20 kg	1/2
40 kg	1
> 40 kg	1+1/2

ANIMALES DE COMPAÑÍA

Antiinflamatorios

Retardoesteroide Suspensión inyectable



COMPOSICIÓN:
Triamcinolona
acetónido
2 mg

INDICACIONES: Inflamación originada por infecciones, alergias traumáticas u otras etiologías.

POSOLÓGIA: Vía IM o IART. 0.05 - 0.1 ml por cada kg de p.v. **Perros**

PRESENTACIÓN: 50 ml

Prescripción
veterinaria
Reg:
ICA 3079 DB



Cardíacos



Banacep® Vet 5 mg Comprimiento recubierto con película para perros y gatos



COMPOSICIÓN:
Benazepril
(equivalente a
clorhidrato de
benazepril 5 mg)
4,6 mg

INDICACIONES: **Perros:** Tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva. **Gatos:** Reducción de la proteinuria asociada con la enfermedad renal crónica.

POSOLÓGIA: Vía oral, una vez al día. **Perros:** > 5 - 10 kg: 1/2 comprimido. > 10 - 20 kg: 1 comprimido. **Gatos:** > 2,5 - 5 kg: 1/2 comprimido. 5 - 10 kg: 1 comprimido.

PRESENTACIÓN: 14 comprimidos

Prescripción
veterinaria
Reg:
ICA 8460-MV

**BANACEP®**

Aumenta su esperanza y calidad de vida.

PESO (kg)

NÚMERO DE COMPRIMIDOS



>5-10 kg

1/2

BANACEP® Vet 5 mg



10-20 kg

1

BANACEP® Vet 5 mg



PESO (kg)

NÚMERO DE COMPRIMIDOS



2,5-5 kg

1/2

BANACEP® Vet 5 mg



5-10 kg

1

BANACEP® Vet 5 mg



Complementos nutricionales



Promocalier® L 47.0



COMPOSICIÓN:
Hidrolizado de proteínas animales (19 aminoácidos), Vitamina A, Vitamina D3, Tiamina, Riboflavina Piridoxina, Cianocobalamina, Biotina, Inositol, Menadiona, Nicotinamida, D-Pantenol.


INDICACIONES: Momentos de estrés, en desequilibrios y deficiencias nutritivas, en estados de depauperación, convalecencias, en periodos de gestación y lactancia.

POSOLÓGIA: Vía oral. 2 ml / 10 kg p.v. / día.

PRESENTACIÓN: 20 ml, 100 ml, 1L y 5L

Reg

ICA 13476 SL



Desinfectantes

Despadac®



COMPOSICIÓN:
Cloruro de didecil 10 g
Glutaraldehído 4 g
Gloxal 3.2 g y
Formaldehído 3.15 g

INDICACIONES: Limpieza y desinfección de locales, alojamientos, utensilios, material ganadero, avícola e industrial, transportes ganaderos, etc.

POSOLÓGIA: Diluir al 0.5 % para obtener una actividad bactericida, diluir al 1 % para obtener una actividad fungicida, diluir al 2 % para obtener una actividad viricida o en aplicaciones sistemáticas

PRESENTACIÓN: 25 L

Sin prescripción veterinaria

Reg:

ICA 3162 DB

ANIMALES DE COMPAÑÍA

Calibiotico® 150 mg/ml Suspensión inyectable



COMPOSICIÓN:

Amoxicilina
(trihidrato)
150 mg/ml

INDICACIONES: Infecciones causadas por gérmenes sensibles a la amoxicilina ubicados en: Tracto digestivo, tracto respiratorio, tracto genitourinario, piel y tejidos blandos. En las complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina en enfermedades específicas.

POSOLÓGIA: Vía IM o SC. 7.5 mg/kg p.v. por día. Equivalentes a 1 ml de Calibiotico (r) por cada 20 kg de peso vivo.

PRESENTACIÓN: 100 ml

Prescripción
veterinaria

Reg:

ICA 3501 DB



Antiparasitarios



Zipyran® Sabor



COMPOSICIÓN:

Prazicuantel

50 mg

Pirantel

(embonato) 50 mg

Febantel 150 mg

INDICACIONES: Tratamiento de las principales parasitosis intestinales caninas producidas por los siguientes parásitos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia hydatigena* y *Dipylidium caninum*.

POSOLÓGIA: 1 comprimido cada 10 kg p.v. Equivalentes a 50 mg de prazicuantel, 50 mg de pirantel y 150 mg de febantel.

PRESENTACIÓN: Caja x 10 comprimidos

Prescripción
veterinaria
Reg

ICA 10482 MV



ZIPYRAN®

Sabor

Protegiéndolo a él, nos proteges a todos.

ZIPYRAN®

Sabor

	PESO (kg)		NÚMERO DE COMPRIMIDOS	
	0,5-2 kg	1/4	ZIPYRAN® Sabor	
	2-5 kg	1/2	ZIPYRAN® Sabor	
	5-10 kg	1	ZIPYRAN® Sabor	
	10-20 kg	2	ZIPYRAN® Sabor	
	20-30 kg	3	ZIPYRAN® Sabor	

Reguladores funcionales



Indigest Solución inyectable



COMPOSICIÓN:
Menbutona
100 mg/ml

INDICACIONES: Normalizador de la función gástrica, duodenal y biliar. Está indicado en aquellos casos en que se requiere una estimulación de las secreciones digestivas: Indigestión, anorexia, envenenamiento, insuficiencia hepática y pancreática.

POSOLOGÍA: Vía IM o IV lento. 1 ml / 10 kg p.v. / día.

PRESENTACIÓN: 100 ml

Prescripción:
veterinaria
Reg

ICA 3541 DB



Sedantes



Seton® 2 % 20 mg/ml Solución inyectable



COMPOSICIÓN:
Xilacina
20 mg

INDICACIONES: Sedación y manejo de animales. Procedimientos de diagnóstico, procesos quirúrgicos de corta duración, procesos quirúrgicos largos: como preanestésico para obtener una anestesia tanto local como general.

POSOLOGÍA: Perros, 15 mL / kg p.v

PRESENTACIÓN: 25 mL.

Prescripción:
veterinaria
Reg:

ICA 3366 DB

ANIMALES DE COMPAÑÍA

Biológicos

Infervac®



COMPOSICIÓN:
Células inactivadas de *Propionibacterium acnes* 0,25 mg,
Lipopolisacárido (LPS) de células de *E. coli* 0,02 mg.

INDICACIONES: Coadyuvante en el tratamiento de los síntomas clínicos y/o lesiones producidas por la infección del parvovirus canino y demodicosis. Estimulante de la inmunidad inespecífica en perros y gatos.

POSOLOGÍA: IM, IV; 1mL para 10 kg, p.v. y 2 mL para un peso superior a 10 kg, repetir a las 48 horas

PRESENTACIÓN: Frasco 10 mL.

Reg
ICA 8697 BV



Inmunair® 17,5%



COMPOSICIÓN:
Células inactivadas de *propionibacterium acnes* 0,17 mg, lipolisacárido de células de *Escherichia coli* 0,05 mg, timerosal 0,10 mg.

INDICACIONES: Estimulante de la inmunidad inespecífica en perros y gatos.

POSOLOGÍA: Vía oral. 1 ml cada 10 kg de p.v., equivalente a 24 gotas por ml, durante 5 a 8 días consecutivos.

PRESENTACIÓN: Gotero 20 mL.

Reg
ICA 6088-BV

